

**Deținătorul autorizației/ Producător:**

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna  
Tel.: +48 17 24 07 111, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechagro.ro

**Distribuitor:** CIECH AGRO ROMÂNIA S.R.L. Str.Uzinei nr.2, biroul nr. 406, Judetul Valcea,  
240050 Râmnicu Vâlcea, România, tel. +40 250 731 852

## TARCZA LAN EXTRA 250 EW

### Produs destinat folosirii de către utilizatorii profesioniști

Certificat de omologare nr: 395PC / 28.02.2018

Conținutul substanței active:

**tebuconazol** (substanța din grupul triazolilor) - **250 g/l** (25,07%)



### Atenție

H315 - Provoacă iritarea pielii.

H 319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.

H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P301 + P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308 + P313 - În caz de expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

P 391 - Colectați scurgerile de produs.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

### Fraze standard de prudență speciale:

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15m până la apele de suprafață.

**A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu**

**condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare.**

**Număr de telefon care poate fi apelat pentru informații suplimentare în caz de urgență:**  
Institutul Național de Sănătate Publică București, tel: 021-318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior  
235 Luni – Vineri, orele: 8.00 - 15.00.

#### **MOD DE ACȚIUNE**

Fungicidul sub formă de lichid pentru prepararea emulsiei apoase cu acțiune sistemică pentru aplicare preventivă sau la apariția primelor simptome ale bolii pentru a proteja grâu de iarnă și rapiță de iarnă împotriva bolilor fungice.

Produsul, de asemenea, are un efect benefic asupra dezvoltării plantelor de rapiță de iarnă.

Produsul este destinat pentru utilizare cu pulverizatoare de câmp autopropulsate sau pentru tractoare.

#### **UTILIZAREA FUNGICIDULUI**

##### **Grâu de iarnă**

*pătarea brună a frunzelor, făinarea cerealelor și ierburilor, rugină brună a grâului*

Doza maximă pentru o singură aplicare: 1,25 l/ha

Doza recomandată pentru o singură aplicare: 0,75 - 1,25 l/ha

Termen de aplicare: Produsul se aplică preventiv sau la apariția primelor simptome ale bolii, începând cu faza de alungire a tulpinii până la sfârșitul fazei de apariție a inflorescenței (BBCH 30-59).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: 1

Cantitatea recomandată de apă: 200-400 l/ha.

Pulverizarea recomandată: cu stropi fini.

##### **Rapiță de iarnă**

*alternarioza cruciferelor, putregaiul negru, putregaiul alb*

Termen de aplicare: Produsul se utilizează preventiv sau după apariția primelor simptome de boală în următoarele termene:

- **în toamnă:** în faza de 4-8 frunze de rapiță (BBCH 14-18)

*alternarioza cruciferelor*

Doza maximă pentru o singură aplicare: 0,75 l/ha

Doza recomandată pentru o singură aplicare: 0,5 - 0,75 l/ha

Numărul de tratamente: 1

##### **Atenție:**

Aplicarea produsului toamna pot afecta suplimentar inhibarea creșterii părții aeriene a plantelor de rapiță și în acest fel poate contribui la îmbunătățirea supraviețuirii plantației în timpul iernii.

- **în primăvara**, în faza inițială a creșterii tulpinii principale (BBCH 30-31).

*putregaiul negru, alternarioza cruciferelor*

Doza maximă pentru o singură aplicare: 1,0 l/ha

Doza recomandată pentru o singură aplicare: 0,75-1,0 l/ha

Numărul de tratamente: 1

##### **Atenție:**

Aplicarea produsului de la începutul primăverii afectează suplimentar scurtarea tulpinilor plantelor de rapiță, astfel încât se poate reduce riscul de cădere.

- **în primăvara**, de la faza butonului floral până la faza căderii primelor petale de flori (BBCH 59-65).

*alternarioza cruciferelor, putregaiul alb.*

Doza maximă pentru o singură aplicare: 1,25 l/ha

Doza recomandată pentru o singură aplicare: 1,0 - 1,25 l/ha

Numărul de tratamente: 1

Numărul maxim de tratamente la culturi de rapiță în perioada de vegetație: 1  
Cantitatea recomandată de apă: 200- 400 l/ha.  
Pulverizarea recomandată: cu stropi fini.

#### **MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE PRIVIND BUNELE PRACTICI AGRICOLE**

1. A se utiliza produsul la temperatura de peste 12°C.
2. Pentru a evita apariția rezistenței în populații de ciuperci patogene la substanțele active din grupul triazolilor, produsul Tarcza Lan Extra 250 EW trebuie folosit alternativ cu preparate fungicide, care conțin substanțe active din alte grupuri chimice, cu un mecanism diferit de acțiune.

#### **PREGĂTIREA LICHIDULUI**

Înainte de pregătirea lichidului trebuie să se determine cantitatea necesară a acestuia.  
A se agita conținutul ambalajului înainte de utilizare. Cantitatea măsurată a erbicidului se toarnă în rezervorul mașinii de pulverizare umplut parțial cu apă (cu agitatorul pornit). Ambalajele goale se clătesc cu apă de trei ori, apele de spălare se toarnă în rezervorul mașinii de pulverizare cu lichidul și se completează cu apă până la cantitatea dorită.

Se pulverizează cu agitatorul pornit. După turnarea produsului în rezervorul mașinii de pulverizare care nu este dotată cu un agitator hidraulic, lichidul se amestecă mecanic.

#### **PROCEDAREA CU RESTURILE LICHIDULUI ȘI SPĂLAREA APARATULUI**

Cu resturile lichidului după tratament trebuie să se procedeze în așa fel încât să se minimizeze riscul de contaminare a apelor de suprafață și apelor subterane definite în Legea privind apele și contaminarea solului și anume:

- după diluarea prealabilă, se utilizează pe o suprafață care a fost tratată, dacă este posibil, sau
- se elimină prin folosirea soluțiilor tehnice care asigură degradarea biologică a substanțelor active ale produselor de protecție a plantelor sau
- se elimină în alte moduri, în conformitate cu prevederile legale privind deșeurile.

După tratament aparatul se spală bine.

Cu apa folosită pentru a spăla aparatul trebuie să se procedeze la fel ca și cu resturile lichidului, folosind același echipament individual de protecție.

#### **CONDIȚII DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI**

Înainte de aplicarea fungicidului, trebuie să fie informate cu privire la acest fapt toate părțile interesate care pot fi expuse la translocarea lichidului și care au solicitat astfel de informații.

#### **Măsuri de precauție pentru persoanele care utilizează produsul:**

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestuia.

Purtați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de protecție în timpul pregătirii lichidului și în timpul tratamentului.

#### **Măsuri de precauție pentru protecția mediului înconjurător:**

A nu se contamina apa cu produsul de protecție a plantelor sau cu ambalajul acestuia.

A nu se spăla aparatul în apropierea apelor de suprafață.

A se evita contaminarea apelor prin canalele de scurgere din ferme și drumuri.

În scopul protejării organismelor acvatice, este necesar să se stabilească zona de protecție cu o lățime de 5 m de la mase de apă și cursuri de apă.

În scopul de a proteja plantele și artropodele care nu constituie ținta acțiunii fungicidului, este necesar să se stabilească zona de protecție cu o lățime de 1 m de la terenurile care nu sunt utilizate pentru agricultură.

#### **Perioada de la utilizarea produsului până la ziua în care pe terenul pe care a fost aplicat erbicidul pot intra oameni și pot fi aduse animale (perioada de prevenire):**

A nu se intra până la uscarea lichidului pulverizat pe suprafața plantelor.

**Perioada de la ultima utilizare a produsului până la recoltarea culturilor (perioada de așteptare):**  
Nu se aplică.

**CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI ELIMINARE ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR ȘI A AMBALAJULUI ACESTUIA**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra produsul de protecție a plantelor:

- în locuri sau obiective, în care au fost implementate soluțiile de securitate relevante împotriva contaminării mediului și accesului terților,
- în ambalajul original într-un mod care previne contactul cu alimente, băuturi sau furaje,
- la o temperatură de 0°C- 30°C.

Se interzice utilizarea ambalajelor golite după produse de protecție a plantelor pentru alte scopuri.

A se transmite produsul neutilizat entității autorizate pentru colectarea deșeurilor periculoase.

Ambalajul golit după produs a se returna vânzătorului de produse de protecție a plantelor care sunt produse periculoase.

**PRIMUL AJUTOR**

Antidot: Nu există, se aplică tratamentul simptomatic.

În caz de necesitate de a consulta un medic, arătați ambalajul sau eticheta. În caz de contact cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.

În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

În caz de expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

Perioada de valabilitate - 2 ani

Data fabricației -.....

Conținutul net -.....

Nr. lotului -.....